BREVE HISTORIA NATURAL

Por Javier Moreno, biólogo

La increíble historia del patito feo

Hacia 1977 quien quisiera observar al pato más exclusivo y extraño del área mediterránea tenía la obligación de visitar el Sur de la provincia de Córdoba, pues solo era posible verlo en Aguilar de la Frontera, el Norte de África o las lejanas estepas de Asia menor y las repúblicas exsoviéticas.

El pato malvasía era por aquel entonces una rareza en Europa y el Norte de África. Los últimos supervivientes de su población occidental se agrupaban —además de en Argelia y Túnez— en solo dos lagunas del Sur de Córdoba, la laguna de Zóñar y la laguna de El Rincón. En noviembre de 1977, un grupo de ornitólogos cordobeses se sintió horrorizado al contemplar una cacería en la laguna de Zóñar. Pudieron ver cómo disparaban sobre los patos y cómo las últimas 22 malvasías europeas se sumergían asustadas y se escondían entre los carrizos para escapar de una auténtica lluvia de plomo sobre la laguna. De no haber actuado a tiempo, habrían desaparecido para siempre del viejo continente.

Aquellos ornitólogos decidieron trabajar en la protección de la especie con sus propios medios, sin ayuda de la Administración. Crearon una asociación, Amigos de la Malvasía, y empezaron a recaudar fondos para comprar las últimas dos lagunas andaluzas donde vivía este pato. Con el tiempo, consiguieron reunir el dinero suficiente, 3.900.000 pesetas, para comprar la laguna de El Rincón, en la que nidificaban varias parejas de las malvasías que, habitualmente, observaban en Zóñar. Con la compra se prohibió la caza en la laguna y, con esta acción, se inició la presión social por salvaguardar los últimos reductos de la especie. A la Administración no le quedó otra que reaccionar y declarar las lagunas del Sur de Córdoba como Reservas Naturales, prohibiéndose la caza en todas ellas.

La compra de una laguna y la protección de las restantes tuvieron enseguida una notable respuesta. Las malvasías pasaron de 22 ejemplares en 1977 a 52 en 1980 y a 220 en 1985. Hacia 1999, la población había crecido ya hasta las 1.659 malvasías, pero en los dos años siguientes se alcanzaría la cifra récord de hasta 4.489 ejemplares repartidos por numerosas provincias del Sur de España. En la actualidad, la población de malvasías se mantiene en torno a los 2.300 ejemplares y siguen viviendo en las lagunas del Sur de Córdoba, pero, también, en las lagunas del Suroeste de Jaén, en Sevilla, en Málaga, Cádiz, Almería y hasta en la mítica Doñana. A partir de la protección de los ejemplares cordobeses, este pequeño pato buceador se las ha apañado para ir colonizando nuevamente su antigua área de distribución y, ahora, se las puede observar en sitios como la Laguna de la Veguilla (Ciudad Real), Laguna de Villacañas (Toledo), la Laguna de Petrola (Albacete), el Parque Natural de El Hondo (Alicante), o la Albufera de Mallorca (Islas Baleares). Asimismo, hay varios proyectos de reintroducción de la especie en Francia e Italia.

Al igual que en la fábula del patito feo, la historia de la extraña malvasía cabeciblanca tiene como colofón una moraleja, la moraleja de que nuestra especie, capaz de hacer los mayores desaguisados a nuestro entorno, es también capaz de luchar con ahínco y de forma exitosa para conservar nuestro rico y exclusivo patrimonio natural. El caso de la malvasía es un ejemplo de libro de esta forma de actuar; esperemos que el ejemplo cunda.

FICHA TÉCNICA

Malvasía cabeciblanca
(Oxyura leucocephala)

Pato buceador, rechoncho y algo achaparrado. Longitud 43–48 centímetros. Envergadura, 62–70 centímetros. Presenta dimorfismo sexual. El macho, en época reproductora, tiene un abultado pico de color azul y la cara es más blanca; la hembra resulta más oscura y no tiene el pico azul. Se enfrenta a varias amenazas importantes. Una de ellas es la alteración de los sistemas lacustres, mientras que la otra es su hibridación con una especie exótica e introducida, la malvasía canela (*Oxyura jamaicensis*), cuyos ejemplares aparecen en nuestra región tras escaparse de colecciones privadas y naturalizarse en el Sur de Inglaterra. Se puede observar en Jaén en lagunas en buen estado de conservación, como las Reservas Naturales de Laguna del Chinche y Laguna Honda, en Alcaudete.
Categoría de Protección en España:
En peligro de extinción.
Categoría de Protección en Andalucía:
En peligro de extinción.

M.A. DOMÍNGUEZ GALÁN.

?

Sabía que...
La introducción de peces en las lagunas done viven las malvasías ***suele originar la alteración de su hábitat*** y el abandono de la zona por parte del curioso pato

EN IMÁGENES



Por Juan Ledesma

VIBORERA *(Echium plantagineum)*

NAZARENO *(Muscari comosum)*

NATURALEZA